

n° 27. ^{l^{re}}

Memoire contenant diverses observations.

- 1.^o Sur une plaie d'arme à feu.
- 2.^o Sur plusieurs plaies contuses.
- 3.^o Sur une expectoration vasculo-membraneuse.

Par M. Michaud, ancien élève des écoles ^{royales}
de Chirurgie et Maître en Chirurgie à Aubervilliers
l^{re} - Paris.



Les plaies d'armes à feu ont des caractères qui leur sont propres et les font différer des autres espèces. La cause qui les produit, la nature des parties lésées, les symptômes et accidents qui les accompagnent les font différer des autres plaies, et exigent un traitement particulier qui leur convienne.

Les difficultés qui se présentent dans leur cure sont produites en grande partie par la dilacération des muscles, des tendons, des nerfs, des vaisseaux de tous genres, par les fractures des os, les déchirures du périoste &c. Le concours de tous ces accidens, ou seulement d'une partie forme souvent une plaie d'une surface très étendue, irrégulière, faite de lambeaux de

ARC 41
n° 102

parties déchirées, contuses, machées et meurtries; susceptibles de tomber promptement en gangrene, ou qui ne pourroient fournir qu'une suppuration putride et sanieuse aussi dangereuse elle-même que la gangrene.

La commotion produisant la stupeur dans les playes d'armes à feu détruit ou affaiblit extrêmement l'action organique des chairs ce qui augmente beaucoup le danger. Les étranglements et engorgemens considérables sont aussi à craindre.

Le traitement des playes dont il s'agit présente une seule indication à remplir en regard au nombre et à la gravité des symptômes qui les accompagnent.

Et il exige de la part du chirurgien beaucoup de lumières et de sagacité. Je vais rendre compte de celle que j'ai eu occasion de traiter.

Première Observation

Le 21. Decembre 1772. Le nommé Augustin Nicolas Bonneau fils, âgé de quinze ans, s'amusant à faire la chasse à des moineaux avec un fusil en assez mauvais état et fort mal chargé. Après plusieurs tentatives;

Il vint à bout pour son malheur de lui faire prendre feu, l'explosion fut si forte que le fusil cassa: toute la charge traversa la main gauche de Borneau et y produisit un délabrement épouvantable.

La majeure partie de la peau qui recouvre le dos de la main jusqu'à environ deux ou trois travers de doigt au-dessus de l'articulation du poignet, une partie de celle qui recouvre l'intérieur de la main et la base des trois derniers doigts étoient enlevés et détachés l'un de l'autre aussi adroitement que si cette séparation eût été faite avec un scalpel.



La première phalange du petit doigt étoit restée à la portion de peau &c. Le doigt indicateur étoit détaché et séparé du reste de l'extrémité dans son articulation avec le premier os du métacarpe. Le premier tendon de l'extenseur commun, celui de l'indicateur ou l'extenseur propre de l'index et le premier du profond avoient été rompus à leur origine et avoient emporté avec eux une petite portion de fibres musculaires qui étoit comme étrangée. A la première phalange de ce doigt il y avoit une portion du muscle adducteur de l'index et de la ponceuse palmaire recouverts de la peau et irrégulièrement détrempés. Le doigt s'est trouvé totalement recouvert de la peau, garni de son ongle et aucune de ses phalanges n'étoit fracturée.

La troisième phalange d'adroit du milieu étoit détachée
et enlevée de son articulation par une section nette. Les
deux autres sont restées recouvertes de la peau et articulées
avec le second os du métacarpe.

Il n'est resté de doigt annulaire que la première phalange
dépouillée de la peau et articulée avec le troisième os métacarpien.

Quelque perquisition que j'aie fait ou fait faire, il a été
impossible de trouver le pouce, duquel il n'est resté que la
base de la première phalange laquelle est ^{demeurée} ~~restée~~
adherante au premier os de la seconde rangée de ceux
du poignet. Les second, troisième et une portion du quatrième
de la seconde rangée des os du carpe, l'os pinforme, la moitié
inférieure du second os de la première rangée, la troisième
phalange du doigt du milieu, celle du doigt annulaire
et le petit doigt tout entier ont été aussi perdus.

La charge du fusil ayant traversé l'articulation du
métacarpe avec le poignet, j'ay trouvé une portion ~~de~~
du dernier os de la seconde rangée du carpe fracturée
ou pour mieux dire brisée, le second os du métacarpe dans
le même état à sa partie moyenne, et sa base enportée,
les deux derniers os du métacarpe étoient entiers; mais
la peau et une partie de leurs muscles avoient été enlevés
ou déchirés sans que les deux premières phalanges du doigt
du milieu ~~ne~~ eussent été interposées. Toutes ces
parties étoient restées unies ensemble; mais fort éloignées

de l'articulation du poignet. Elles n'y étoient jointes que
par les tendons des muscles sublimés et profond qui les
tenaient comme suspendues à cinq ou six poises de
l'articulation.

Voilà à peu près quel étoit l'état du bras lorsque je
le vis pour ainsi dire à l'instant qu'il reçut la blessure. On
peut encore ajouter à tout cela le désordre des parties molles
tel que les muscles, les nerfs, les tendons et vaisseaux de tous
genres loupés, meurtris, machés et déchirés. Les artères rendoient
peu de sang à l'instant de la blessure et cela devoit être ainsi.

On sait que lorsqu'une artère se trouve ouverte par
une cause quelconque il s'ensuit nécessairement une
hémorrhagie plus ou moins considérable et plus ou moins
difficile à arrêter, que si l'artère ouverte est considérable,
que la section soit transversale et qu'elle soit retenue en place
par des vaisseaux voisins qui en l'entraînant s'opposent à sa
retraction, action absolument nuisible au vaisseau ouvert
pour s'opposer à l'effusion du sang. Alors l'hémorrhagie est
plus considérable et plus difficile à maîtriser. Il suit de ce
principe que dans le cas où l'ouverture d'une artère sera faite
irrégulièrement, qu'elle sera comme frangée et que l'extrémité
de cette même artère sera pour ainsi dire abandonnée à elle-
même, l'hémorrhagie sera moindre et plus aisée à arrêter;
parce que les fibres longitudinales et circulaires de l'artère en se
contractant tendront à diminuer son calibre; alors l'extrémité



du vaisseau ouvert se trouvera fermée et opposera une digue
à la sortie du sang. La retraction des chairs ambiantes peut
encore concourir à cet effet et aider à la formation du
caillot. On peut aussi ajouter que la stupeur produite par la
commotion qui arrive dans les plaies d'armes à feu peut
affaiblir l'action organique des artères et la circulation du
sang dans la partie blessée, par conséquent s'opposer à l'hémor-
-rhagie, au moins dans l'instant de la blessure. C'est précisément
ce qui est arrivé dans le cas dont il s'agit. Les artères cubitales
et radiales ayant été déchirées irrégulièrement, l'hémorrhagie
n'est survenue qu'environ seize heures après l'accident. Inomi-
nable par sa quantité bien considérable.

Passons maintenant au traitement que j'ai suivi pour
obtenir la cure de tous ces troubles. Mon premier soin fut
de prendre des précautions contre l'hémorrhagie consécutive
à laquelle je m'attendais. En conséquence j'en mis plusieurs
compresses longitudinales et graduées sur le trajet de l'artère
brachiale et j'appliquai par dessus le Gaxot de Morel médi-
ocrement serré. J'avois eu auparavant la précaution de
mettre une gouttière de carton à la face externe du bras
afin que la plus forte pression agit directement sur
l'artère et que les parties voisines en fussent moins comprimées.
Ensuite ne pouvant pas pouvoir conserver ce qui étoit resté
de la main détachée de son articulation, je me décidai à l'en
séparer tout à fait la regardant alors comme corps
étranger. J'appellai mon père en consultation qui fut

avec de même avis. J'amputai cette partie sur le champ.
Cette opération ne fut ni longue ni douloureuse, puisqu'il
ne s'agissoit que de faire la section des tendons des muscles
sublime et profond qui étoient déjà rompus à leur origine.
J'appliquai sur l'orifice des artères ouvertes un morceau d'agari
de chêne, et par dessus un bourdonnet de charpie trempé dans
de l'eau distillée. Je garnis toute la surface de la plaie de
charpie sèche soutenue par le bandage appelé l'appelée.
Je plaçai le membre malade dans une situation conven-
nable; et deux heures après, je saignai mon malade au
bras. Le soir, je répétai la saignée. Je passai la nuit
suivant auprès du malade ayant soin d'examiner
de temps en temps s'il ne seroit pas d'hémorrhagie.
Ce ne fut que vers le milieu de la nuit que je m'aperçus
que l'appareil commençoit à être transpercé de sang. Je
renversai de suite le champ de gaze qui avoit eu la précaution
d'appliquer précédemment et l'hémorrhagie cessa aussitôt.
Suivant comme j'avois un second appareil tout préparé
en cas de besoin. Je levai le premier à l'exception de la charpie,
sur laquelle j'en ajoutai même de nouvelle. J'appliquai le
second bandage de la même manière que j'avois fait le premier
et je le laissai jusqu'au quatrième jour. L'hémorrhagie ne
reparaît plus. Mais il survint un gonflement considérable,
tout l'avant bras, le bras et une partie de l'épaule furent
extraordinairement tuméfiés et enflammés; et cela devoit
être dû à cause des raisons alléguées cy devant. Je combattis



est accidens par la diète auctant qu'il me fut possible et ^{des} ~~des~~
fomentations emollientes. Souvent répétées sur les parties
engorgées et enflammées. L'état des forces du malade ne
me permit pas de recourir de nouveau à la saignée. La
tension et le degorgement des parties ne diminuerent
considérablement que lorsque la suppuration fut bien
établie. L'inflammation et la douleur avoient beaucoup
diminuée par l'application des fomentations emollientes
et par le jeûne de diète que j'avois pu obtenir.

Je ne dois pas oublier de dire qu'il ne me fut pas possible
de faire observer aucun régime à mon malade à cause
de son indocilité; j'en pris le tenu que sept à huit jours
à la diète malgré la fièvre et les autres accidens; Et encore
quelle diète? puisqu'il prenoit très souvent des bouillottes
très surchauffées qui lui fournissoient peut être plus de chaleur
qu'il n'en faisoit dans sa meilleure santé. Il n'a pas non
plus été possible de le purger une seule fois pendant le
cours de sa maladie. Il est vrai qu'il a payé cher son
intemperance et son indocilité comme on le verra dans
la suite. Je reviens à la suite du traitement.

Je n'eus donc pu Securio Bonneau que par l'emploi
des différens topiques. Au second pansement que j'eus
le quatrième jour de la blessure sans violence la majeure
partie de la charnie que j'avois mise précédemment. Je trouvais
toute la surface de la plaie gangrenée, de couleur brune et

exhalant une très mauvaise odeur, il s'en écoulait très peu
de pus ichoreux et fétide, les bords étoient fort engorgés et
enflammés. Cet état dura jusqu'à douzième jour où les
choses ont commencé à changer de ~~face~~ face. Voici comme
je fis mon troisième pansement. J'appliquai sur l'extrémité
des os restés à découvert et qui s'écartent exfoliés par la suite de
différents intervalles, les pans des os, un plumaceau imbibé
de teinture de Myrrhe et d'aloë, je garnis le reste de la plaie
mollement de plumaceaux trempés de digestif animé, pour
devenir concrépétif d'onguent de styrax, et le reste de la plaie
à l'ordinaire, en continuant toujours les fomentations com-
me devant. Au paroxysme suivant, je lavai la plaie
avec du vin de Malthe ou de Malte et je trempai les compresses
dans le même vin. Ce traitement fut continué pendant
quatre jours, tenu où l'état de la partie blêmie fut beaucoup
amélioré. La suppuration devint de meilleure qualité,
le pus plus odorable, la majeure partie des chairs gangrenées
est tombée, toute la surface de la plaie commençoit à
devenir vermeille, le coule, le bras et l'avant bras étoient
considérablement degorgés et diminués de volume. Alors
je commençai à ne plus panser qu'avec le digestif simple
et le styrax. Ensuite je ne me servis plus de digestif, les
chairs étoient dans le meilleur état possible, les os exfoliés étoient
recouverts et la cicatrice commençoit à se former à la circon-
férence de la plaie.



On voit que Bonneau en cet état entroit en
convalescence. Il commençoit en effet à reprendre
des forces éprouvées tant par la maladie que par l'abondance
de la suppuration. Il croit alors qu'en mangeant beaucoup il
se guérira plus promptement et qu'il ira plus vite. Il ne
songe même plus possible ainsi dire qu'il est malade,
boit et mange sans discrétion. Les chairs de la plaie
se sont gonflées, ramollies et devenues fongueuses, le pus
est devenu serus et abondant, et la marche de la
cicatricisation s'est beaucoup ralentie. En sorte que si Bonneau
eût été docile il aurait été guéri bien plus promptement
et n'aurait pas été un an à attendre une cicatrice qu'il
aurait probablement obtenue dans un espace de temps
beaucoup plus court. J'ay eu soin de réprimer autant
qu'il m'a été possible les chairs baveuses par les différents
moyens connus tels que les déviciatifs, les catartiques &c.
J'ay même toujours pansé avec de la charpie sèche. Le
dernier moyen est celui qui m'a le mieux réussi.

Deuxieme Observation.

Les playes contuses sont entre toutes les autres especes de playes celles qui ont le plus d'analogie avec les playes d'armes à feu tant par rapport à la cause qui les produit, que par la gravité des Symptomes et accidens dont elles sont souvent compliquées et la nature du traitement qui leur convient. Celle qui fait le sujet de cette observation en va donner la preuve, etant accompagnée de Fracture d'os, rupture de tendons, déchirement du périoste et dilaceration de muscles et d'aponeuroses.

Je fus appelé le 24. Juin 1776. pour panser le nommé Jacques Louis Ribouillet, garçon fort et vigoureux, âgé de trente quatre ans. Lequel venoit d'être mordu à la main droite par un cheval qui l'avoit terrassé et lui avoit fracturé la clavicule droite d'un coup de pied. Il avoit encore reçu d'autres contusions de la part dudit animal, tant à la tête qu'en d'autres parties du corps; mais qui ne furent pas de grande consequence.

La playe de la main et la fracture compliquée de la clavicule furent les blessures qui fixerent le plus mon attention. Je vais en faire la description qui sera suivie du traitement que j'ay employé pour en obtenir la guerison.

Le cheval Saint Lamine de Ribouillet avec Sismachius
entre la première phalange du pouce et le premier os du
métacarpe. Celui-ci fit des efforts pour retirer la main de la
bouche de cet animal et c'est probablement ce qui occasionna
le grand déchirement du lambeau dont j'ai parlé ci après.
La plaie ~~de la main~~ de la main avait une forme à peu près demi
circulaire, elle s'étendait depuis l'extrémité inférieure du second
os métacarpien, le premier étant brisé vers sa partie moyenne
et supérieure, parait ensuite à la base de la première phalange
du pouce et se terminait sur cette dernière près de son articula-
tion avec la seconde. Les tendons de l'extenseur commun ou
grand extenseur, celui de l'extenseur propre de l'index, et celui
du court extenseur du pouce furent coupés transversalement.

La figure de la plaie de l'intérieur de la main étoit à
peu près la même. Les muscles thenar et antithenar ainsi
que les teguments qui les recouvrent étoient enlevés avec ^{et déchirés}
une portion de laaponévrose palmaire. Ceci formoit un lambeau
considérable qui étoit détaché de la base de la première
phalange du pouce et de l'intérieur de la main; et laissoit
à découvert les tendons des muscles sublimis et profond.
Ce lambeau n'étoit resté attaché que par une petite portion
à l'extrémité de la première phalange du pouce. Les deux
plaies communiquoient ensemble, ce dont j'eus su par
à l'aide d'une sonde avec laquelle je traversai l'épaisseur de
la main et par les injections que j'y fis faites dans le cours du

traient. Cette communication existoit entre le premier
et second os metacarpien près de la fracture du premier des os.

La fracture de la clavicule commençoit à la partie anté-
rieure du milieu de cet os dit côté de l'épaule, se continuoit
obliquement dans son épaisseur et alloit se terminer à son
partie postérieure dit côté qui regarde le sternum. La portion
antérieure de l'os fracturé avoit pénétré la peau et s'élevait
cette dernière d'environ deux lignes.

J'ai commencé mon traitement par faire la réduction de la
clavicule. J'ai placé à cet effet un aide derrière le malade qui
appuyant un genou sur les apophyses épineuses des vertèbres
dorsales entre les deux omoplates et ses deux mains sur l'articulation
des bras avec les épaules du malade, il faisoit par ce moyen des
extensions et contre extensions graduées; pendant que de mon côté
je meudois à faire rentrer la portion de l'os sortie et j'opérois la
réduction de la fracture. Pour maintenir les parties réduites
j'ai appliqué le bandage appelé huit de chiffre ayant eu soin
de mettre au paravent une compresse longue qui s'étendoit d'une
épaule à l'autre et dont j'ai rabattu les bouts en devant pour fixer
les différentes circonvolutions du bandage. J'ai garni autour
qu'il m'a été possible toutes les cavités des environs de la fracture
avec de la charpie trempée dans un mélange d'eau de violet
de blanc d'œuf battus ensemble; mélange qui comme on sait
se colle exactement à la peau en se desséchant, se moule sur la
forme de la partie sur laquelle il est appliqué et dont la consis-
tance s'oppose en partie au déplacement des os fracturés. J'ai
appliqué ensuite deux compresses longues et adhésives de



la clavicule et une cruciale parodemes. J'ay mis aussi sous
chaque aisselle des compresses que j'ay préférées aux pelotes
afin de faire une compression moins forte sur les vaisseaux qui
passent en cet endroit. J'ay appliqué ensuite le huit de chiffre
et parodemes le bandage appelle spica. Tel a été mon appareil.
La fracture a guéri parfaitement dans l'espace d'environ six
semaines.

Voici maintenant comme j'ai été conduit pour obtenir
la cure des playes de la main. Après avoir fait la réduction et
posé l'appareil de la fracture de la clavicule, j'ay lavé ces playes
avec du vin tiède pour faciliter l'extraction de la terre et autres
corps étrangers qu'elle contenoient. J'ay prouvé ensuite la
réduction de la fracture du premier os du métacarpe, j'ay
mis la main dans une situation favorable pour faciliter le
rapprochement des tendons rompus et j'ay réappliqué le
bandeau dans sa situation naturelle pour tâcher d'en
prouver la reunion. Ensuite j'ay garni mollement ces playes
de charpie recouverte de compresses trempées dans du lait
mariné animé avec un tiers d'aunerie, et j'ay recouvert
le tout d'un bandage propre à maintenir les parties blessées
dans leur situation naturelle. J'ay saigné le malade et
lui ai prescrit un régime analogue à son état.

Le lendemain la fièvre s'est déclarée avec force, accompagnée
d'oppression, insomnie, éructement de sang et violent mal
de tête. J'ay combattu ces accidens par la diète le régime anti-

-phlogistique et les saignées répétées. Suivant leur intensité et l'état des forces du malade. Les accidents ont commencé à diminuer le quatrième jour. Le sixième jour de la blessure les plaies de la main surtout celle qui étoit à l'intérieur étoient sèches, de couleur brune et sans apparence de suppuration prochaine. La main, l'avant bras et une partie du bras considérablement tuméfiés et enflammés. J'ay soignée alors ces parties avec une decoction emolliente, j'ay trempé les compresses dans la même decoction et j'ay fait des injections avec le vin de quinquina miellé. Vers le huitième jour la tension, le gonflement et l'inflammation ont commencé à diminuer, une suppuration louable et de bonne qualité a occasionné le dégorgeement des parties, et la chute de plusieurs escarres qui étoient tant aux bords du lambeau, qu'aux parties dont il s'étoit détaché. Depuis quelques jours je pansois ces plaies avec des plumaceaux chargés de digestif animal, recouverts d'un emplâtre d'onguent du tigre, ensuite j'ay employé successivement la Baume d'Ancres et la charpie sèche. La régénération des chairs s'est opérée, le cal de la fracture s'est formé, la déhiscence des plaies s'est faite, les parties divisées et surtout le lambeau se sont réunis, enfin j'ay obtenu une bonne et solide cicatrice le 15. Août. Suivant c'est à dire sept semaines après l'accident.

Le malade a recouvert l'usage des parties blessées. Il ne lui reste qu'un peu de gêne dans les mouvements du pouce et de l'index, qu'il ne peut étendre ni fléchir complètement. Cela néanmoins ne l'empêche pas de faire tous ses travaux ordinaires comme avant la blessure.



Troisième Observation

Le 25. octobre dernier (1779) le nomme Etienne Pingard, au hameau de Freveaux parois de la Couronne, âgé d'environ cinquante ans, d'un tempérament bilieux sanguin et d'un caractère fort vif; conduisant trois chevaux attelés à un tombereau chargé de terre, se laissa tomber dans une hornière. Une des roues du tombereau lui passa sur le pied gauche où il lui fit une légère contusion; son corps se trouva fortement pressé entre la roue et l'hornière, et son dos qui étoit tourné du côté de la roue fut excorié depuis les omoplates jusqu'aux lombes. Il avoit le côté droit appuyé sur l'hornière où se trouvoit une pierre qui lui fractura la cinquième vraie côte vers son milieu et du même côté. Enfin la roue finit par lui passer sur la main droite. Le doigt du milieu fut légèrement excorié, l'annulaire eut une plaie contuse de figure irrégulière à son extrémité et sur la dernière phalange, la racine de l'ongle de ce doigt fut écorchée et détachée en partie. Le petit doigt fut le plus mal traité. La première et la seconde phalange furent écorchées à leur articulation commune et se séparèrent dans la suite, la queue des tendons ^{de ces} ~~de ces~~ tendons des muscles sublime et profond furent rompus avec leurs tegmens; ce qui formoit

un lambeau irrégulier depuis la base de la première pharynx
jusqu'à la base de la première. Il y avoit aussi une plaie
sans étendue de l'extérieure commune; Et ces deux plaies
communiquoient ensemble en sorte qu'à l'articulation
on voyoit cette communication et qu'il étoit facile
d'y passer un gros stilet sans en toucher les parois. Ce
doigt n'étoit resté qu'à la main que par les parties
latérales.

Cel étoit l'état du malade lorsque j'e vis la première
fois, peu de temps après la blessure. Je commençai par
faire la réduction de la fracture de la côte que j'e maintenue
avec le bandage de corps soutenu d'un singulier. J'y fis
des fomentations et j'appliquai des compresses trempées
dans de l'eau marinée au miel de rose de vie sous les
excoriations du dos et sous la contusion du pied. Je pansai
les doigts du milieu et annulaire à peu près de la même
manière le premier jour.

Quant au petit doigt j'en eus le comportement d'une autre
manière. Je lavai la plaie avec du vin tiède. Je fis de mon
mieux la réduction des os fracturés, j'e rapprochai les parties
molles divisées et j'e tachai de les maintenir dans cette
situation avec de petites bandelettes circulaires de taffetas
d'Angleterre. Je mis des compresses longitudinales propor-
tionnées au volume de la partie soutenues d'une bande et



et d'une attelle de bois léger, je recouvris la main et une partie
de l'avant bras de compresses trempées dans de l'eau marinée,
et je saignai deux fois le malade d'un même jour.

Je ne levai et n'appareil qu'une semaine. Je trouvais
la main fort tuméfiée et enflammée ainsi que le petit doigt;
la playe étoit livide, il en devoit sortir un peu de serosité
ichoreuse et très fétide. Je coupai alors les bandelettes de taffetas
dans la crainte qu'elles n'augmentassent le traçement. Du
reste je me comportai à peu près de la même manière que
dans l'observation précédente. Après la chute d'une partie des
escarres je remplis le vuide qu'il laissai avec de la poudre de kinkin
que j'employai à chaque pansement. Les extrémités des deux phalanges
fracturées se séparèrent, et il se détacha plusieurs
esquilles de ces mêmes os pendant le cours du traitement qui
à duré près de deux mois. Enfin les parties divisées se sont
reunies et j'ay terminé l'œuvre.

Le doigt comme on peut le voir a perdu son mouvement
dans le cas dont il s'agit (ilalloit-il sur le champ en venir à
l'amputation. du doigt comme moyen d'obtenir une
guérison plus prompte ?

Je ne le pense pas parce qu'il est toujours dur à un
chirurgien de proposer une opération à son malade (quelque
léger qu'elle soit) ~~parce qu'il s'agit de la vie~~ D'ailleurs il y a
plus d'art à conserver une partie qu'à la retrancher quelque
bien qu'on le fasse. Le tenon ne coûte rien lorsqu'on parvient à
la fin qu'on s'est proposé; surtout lorsqu'il s'agit d'un objet
aussi intéressant que celui de la conservation des membres
d'un malade.

Quatrième Observation

Vers la fin du mois de novembre dernier (1779) Le
Monsieur Jean Cheuvreire l'aîné, habitant de cette paroisse,
et âgé de soixante quatre ans. étoit occupé à placer du
vin dans l'écave, et la main droite et particulièrement le
doigt de milieu violemment serré entre un nuet et le bout
d'un tonneau qui se remuoit. Le bord de ce tonneau lui fit
une plaie contuse intérieurement s'écartant l'articulation de la
première avec la seconde phalange de ce doigt, en coupant
transversalement les tendons qui seroient cette partie
et l'airant la quai de tendons à découvert. Je regarda
d'abord cette blessure comme de peu de conséquence et se
contenta d'y appliquer quelques compresses trempées dans
de l'eau de vie mêlée de vin commun. Je le vis quelques jours
après son accident. Je trouva le doigt et une partie de
la main tumefiée, douloureuse et enflammée. Je lui conseillai
l'usage de cataplasmes émollients et un onguent qui le soulagea
considérablement. Deux ou trois jours après la tension, la douleur
et l'inflammation furent beaucoup diminuées. Je le perdîs
alors de vue. Ce ne fut que le 11. décembre suivant qu'étant
un peu inquiet de son état j'allai le voir de mon propre
mouvement. Je le trouvai paraître par un médecin et
ne fut qu'avec peine qu'il se détermina à me montrer la plaie.
Son médecin vétérinaire lui avoit constamment enduit



et enveloppé toute la main de corps gras et naues. Dans
la même journée il lui avoit ouvert une grosse phlébotomie
sur le dos de la main qui étoit gangrenée. Comme il sortoit de
cette phlébotomie beaucoup de Serosité; cela lui fit croire qu'il
avoit fait une grande opération ~~pour~~ à ce que le malade
declara qu'il souffroit moins en cet endroit que les jours
précédents. Sans doute à cause de la gangrene qui étoit surve-
nue. J'eus peine à obtenir la confiance du malade dans ce
moment parce qu'il craignoit l'opération que j'~~lui~~ proposai
de faire ^{lui} comme indispensable (il s'agissoit de Scarifier les parties
gangrenées et enorgées). Néanmoins il a su me rendre justice
dans la suite et m'en témoigner sa reconnaissance. Je
reviens à mon objet.

Après de couvrir la main du malade qui étoit
couverte d'emplâtres et enduite d'onguent d'Althea
extrêmement rare et enveloppé de plusieurs linges gras
et très sales. J'appergus une excroissance gangreneuse qui occupoit
presque tout le dos de la main et que j'escarifiâi sur le
champ en divers endroits. J'eus même obligé de prolonger
mes incisions jusqu'aux parties latérales du doigt du milieu.
Il y avoit sous cet excroissance le foyer d'un abcès dont il sortit
environ quatre onces de pus d'une bonne qualité, l'avant
bras et une partie du bras étoient considérablement gonflés,
tendus et enflammés, les vaisseaux de ces parties étoient fort
enorgées; la main non plus que les doigts qui étoient fort
cartés les uns des autres n'avoit aucun mouvement.
Après avoir vidé l'abcès j'eus le plaisir d'assumer avec

avec de la charpie sèche que j'appliquai mollement
et quelques compresses trempées dans de l'eau de vie
n'ayant pour un moment autre chose sous la main.

Le lendemain j'importai la majeure partie des restes
de l'escarre que j'avois scarifié la veille. Le tendon de
l'intérieur commun du doigt du milieu se trouva à
découvert et se fut exfolié dans la suite du traitement.
Je lavai la plaie avec de l'eau de vie camphrée, j'y appliquai
des plumasseaux chargés de digestif animé, j'en mis un emplâtre
d'ouquet de styrax poudré et j'en couvris le tout de
compresses trempées dans la liqueur ci dessus qui s'étendis
le long de l'avant bras. Alors comme il n'y avoit plus
de gangrene que le bras, l'avant bras et la main étoient
beaucoup dégorgeés et la plaie en bon état; j'ay supprimé
le digestif et l'eau de vie camphrée me contentant de
panseur à sec. Il est bon d'observer que la plaie de l'intérieur
du doigt lorsque j'eus l'opération et le premier pansement
décrit ci dessus. Il s'en faut bien, les bords au contraire
étoient gangrenés; j'en avois scarifié et pansé de même
que le dos de la main.

Tout a été en bon état pendant environ douze jours.
Alors le malade a commencé à se plaindre d'une doulou-
-raison incommode dans l'intérieur de la main qui a
été suivie de l'apparition d'un nouvel abcès. Effectivement
il y avoit un léger engorgement dans cette partie qui devoit



Possible dans la suite j'y apportai l'orifice d'un sinus qui
s'ouvroit dans la playe d'adixit. Je le sondai plusieurs fois
et il ne me fut pas possible de porter mon stilet au delà
de la base de la première phalange. J'employai les différents
moyens connus pour dilater ce sinus afin d'éviter une
nouvelle opération que le malade craignoit plus que la
première. Tous ces moyens furent inutiles. L'intérieur de
la main se gonflait de plus en plus et étoit devenu calleux.
Je parvins enfin à introduire ma sonde plus avant et je
sentis le second orifice métacarpien à l'index ce qui me détermi-
na à persuader le malade de la nécessité qu'il y avoit
d'ouvrir le sinus dans toute sa longueur et mettre le
d'opercule en bois et albi. Je découvrit. Il y consentit enfin.
Je me devois rendre compte de la manière dont j'ay fait
cette opération. C'est le 4. janvier dernier.

J'introduisis une sonde cannelée, par l'orifice du sinus
jusques sous la peau rose palmaire que je pouvais dans toute
sa longueur avec un bistouri, ainsi que les tégumens qui
la recouvrent et qui étoient gonflés, durs et calleux. Il
ne sortit d'abord que du sang de cette incision. Je touchai
ensuite les tendons de muscles sublimés et profonds qui
étoient à découvert et il sortit de dessous ces tendons (l'un
du foyer de l'abès) une issue une ou deux et de plus de
bonne qualité. Je pansai alors avec de la charpie sèche
dont je garnis la playe jusqu'à la fin du traitement. Ces

mêmes tendons étoient altérés, mous, de couleur brune et sans sentiment. Comme il s'opposoit à l'issue du pus dans l'intervalle des pansements quelque situation que j'e donnas^{se} se à la partie malade, et qu'ils étoient mis de vie je me déterminai à en faire l'amputation huit jours après. Ce qui fut fait sans aucune espèce de douleur pour le blessé. Depuis ce moment tout a été constamment de mieux en mieux. Le pus s'est écoulé librement, le dégorgeement de la main et du bras s'est fait, les chairs se sont refermées, régénérées et régénérées. Enfin j'ai obtenu une bonne et solide cicatrice le 5. Février suivant.

On presume bien sans doute par l'exposé ci dessus que le doigt a perdu la plus grande partie de ses mouvements.

Cinquieme Observation.

Je fus appelé le 29. Septembre 1778. pour panser le nommé Louis Hémét, âgé de trente deux ans ou environ, fort et vigoureux, qui avoit une playe contuse et à lambeau d'environ trois poulles de long. Elle avoit à peu près la figure d'un Y grec; elle étoit située au centre du parietal droit et étoit la suite d'un coup que le blessé avoit reçu d'un moilon qui lui étoit tombé sur la tête étant dans une carrière. Une partie

Du cuir chevelu étoit enlevé et restée à Souchepeau,
et une partie de la calotte aponevrotique et du péris crane
déchiré laissoient à l'apex un trou à nu d'une portion du
parietat vers son milieu. J'appris alors qu'il
pouvoit y avoir fracture acetos et je ne pensai pas devois
prouver la réunion des parties divisées. Au contraire
je fis tout ce qui dependoit de moi pour les maintenir
cartées l'une de l'autre. J'aurois même désiré faire des
incisions nécessaires pour modifier de l'état du parietat.
Ce qui ne me fut pas possible d'exécuter pour le moment
parce que le malade craignoit de nouvelles douleurs.

Je me contentai de le panser avec de la charpie trempée
dans le baume de Fioravente dont j'étampouai la
plage et je mis par dessus des compresses trempées
dans la même liqueur. Soutenu par le bandage appliqué
couverchef. Je saignai ensuite le malade, je le mis à
l'adiète et lui prescrivis un régime analogue à son
état.

Il ne me fut pas possible de lui faire observer aucun
régime. Il mangeoit et buvoit quelquefois jusqu'à s'enivrer.
Les chairs des bords de la plage se régénéroient avec une
célérité étonnante sans cependant s'attacher par aucune
de leurs parties à la portion d'os décollée. J'avois soin de
les repurger ne voulant pas laisser cicatrifier la plage avant

de m'être pleinement assuré qu'elles étoient intimement unies
à lui, ou qu'une portion de ce dernier ne se fut exfoliée.

Je continuai d'agir ainsi jusqu'à vers le 20. novembre, jour où
je sentais de nouveau la playe. L'orifice alors en étoit fort petit.
Je crus sentir une portion de la première table saillir. Je m'occupai
à me rendre quel falloit en venir, absolument aux incisions
proposées ci-dessus pour enlever la portion d'os détachée si l'on s'y
obtenoit la guérison. Je le déterminai enfin à St. Soumestre. Il me
fut impossible d'entreprendre cette opération parce qu'alors j'étois
attaqué d'une maladie des plus graves et pour laquelle j'avois
eu deux amples vésicatoires aux jambes quelques jours auparavant.
Aqui joint à mon état de faiblesse extrême m'ôtait la faculté
de me tenir debout.

En conséquence j'envoyai le malade à M.^r Tenon et le priai
de faire l'opération que j'avois projetée. Si toutefois il la jugeait
nécessaire. Cet habile chirurgien se chargea de cette opération
qu'il fit avec la plus grande dextérité et le plus grand désintéres-
sement. Qu'il me soit permis de lui en témoigner aujourd'hui
publiquement ma reconnaissance.

Il fit une incision cruciale d'environ trois pouces tout à l'angle
des quatre angles et enleva les lambeaux, ce qui mit à découvert
la table externe du parietal. Il enleva ensuite une partie de
cette table altérée et fracturée jointe à une portion de diploë
et de la table interne. En sorte que par l'ouverture qui restoit
au parietal on voyoit et touchoit une portion de la dure-mère. Il

panse ensuite avec de la charpie seche dont il remplît la
plaie et mit par dessus quelques compresses aussi à sec.

Le malade étant de retour je continuai à le panser qu'on
que dans un court loj de la même manière jusqu'à
parfaite guérison.

Le vuide que laimoit la portion des enlevée s'est rempli
succesivement et le tout a été parfaitement cicatrisé
le 18 Janvier 1779.

Sixieme et dernière Observation.

Au mois de fevrier 1775. le nomme Nicolas Augustin
Borneau, pere de celui qui fait le Sujet de la premiere
observation, agé de quarante huit ans, d'un temperament
sanguin, vig, robuste et d'une taille mediocre et attaqué
d'une vraie peripneumonie, qui est negligea les premiers jours,
croyant n'avoir qu'un rhume quoiqu'il eprouvat deja les
Symptomes d'une maladie plus grave. Il avoit beaucoup
de loignement pour la saignée. La maladie faisoit toujours
des progrès et les accidens allant toujours en augmentant
il se décida enfin à se faire saigner. Je lui fis trois
amplis saignées en douze heures qui calmerent la violence
des Symptomes. Je le mis à l'usage des delayans et adoucisans.
Les loochs et les lavemens emolliens ne firent point d'effet.
Le crachement de sang, la fièvre, la douleur de côté et la pression

diminuèrent. L'expectation ensuite se fit plus aisément les crachats
paraissant de bonne qualité. La fièvre et la plupart des autres
accidens ayant cessé, je le purgeai le huitième jour de la maladie.
Je réitérai la purgation deux jours après. La convalescence fut
longue tant à cause du mauvais régime qu'avoit observé
le malade, que parce qu'il avoit repris ses travaux de trop
bonne heure; Abus qui n'est malheureusement que trop ordinaire
dans nos campagnes. Bonneau enfin recouvra la santé et
son embonpoint ordinaire excepté qu'il éprouvoit de temps
à autre une douleur de côté sous le sein droit vers le milieu
de la septième ou huitième côte, accompagnée d'une difficulté de
respirer. Accident auquel il ne fit aucune attention parce
qu'il devoit le attendre depuis vingt ans.

Le 16. Du mois d'Avril Suivant il me fit appeler de nouveau
et me dit qu'il souffrait beaucoup plus qu'à l'ordinaire depuis
deux jours et qu'il avoit éprouvé un excès de fatigue. Je lui
trouvai le pouls plein, dur et fréquent, la peau sèche et
brûlante, la langue aride, le visage rouge, les yeux enflam-
més, un violent mal de tête, une insomnie considérable,
l'oppression et le point de côté plus fort qu'à l'ordinaire, bruits
ardents et en petite quantité, enfin tout m'annonçoit une
maladie inflammatoire.
Comme le malade avoit toujours de l'éloignement pour la saignée
je fus obligé de me contenter de le mettre à la diète et lui
prescrire un régime rafraichissant delayant et adoucissant.

Cela fut que le 14. que j'ai fait une saignée du bras. Ensuite
les Symptômes parurent un peu diminuer, il se fit une
expectoration de crachats secs, verts et purulents. Le soir
les accès redoublèrent, mais avec moins d'intensité que
les jours précédents. Le 19. j'ai continué l'usage des boissons
d'algues. Et j'ai prescrit les bouillons de moude
veau avec la bourrache. Depuis ce jour les accès
allèrent toujours en diminuant jusqu'au 21. tems où
la fièvre et la plupart des Symptômes fâcheux avoient
cédé excepté la douleur de côté et l'oppression habituelle
qui cependant avoient diminué au point que le malade
fut en état d'être purgé le lendemain. La purgation
passa bien et ne fatigua pas le malade. Vers trois
heures après midi on vint me chercher pour le revoir. Je
le trouvai alors dans une grande agitation et il me dit
qu'étant à la garde robe et sans faire beaucoup d'efforts,
il avoit éprouvé un évanouissement qui avoit été suivi
d'un accès de toux, qu'il alors revêtu quelque chose qui se étoit
détaché de l'intérieur de la poitrine et qui avoit remonté
dans la gorge, que cela lui étant subitement la respiration,
il avoit aussitôt introduit ses doigts dans la bouche pour
pouvoir extraire le corps étranger qui le suffoquoit, que
l'ayant saisi et tiré de la bouche, l'extraction en avoit été
servie d'une grande quantité de pus qu'il avoit expectoré
avec facilité. Dans ce moment Bonneau avoit le pouls
vif, fréquent et mol, le visage enflammé et une sueur

universelle. Mes premiers Soins furent d'examiner ce que
le malade avoit expectoré. Je trouvai environ une pinte
de pus brun, lié, épais et sanguinolent, de consistance d'une
bouillie claire, d'une odeur ~~de~~ fort aigre et d'une fétidité
insupportable. Il étoit accompagné de plusieurs fragmens
d'une substance comme vasculaire membraneuse, dont les plus
grands avoient à peu près trois ou quatre pouces d'un bord
à l'autre dans leur plus grande surface et sous lesquels il y
avoit plusieurs vaisseaux cylindriques qui se divisoient
en différens rameaux plus petits les uns que les autres, et
dont les plus gros étoient à peu près de la grosseur d'une
plume d'aile de pigeon. Après cette évacuation le malade
dit qu'il sentoît un grand vuide dans la poitrine et qu'il
respiroit plus aisément. Il s'endormit quelques instans après
d'un sommeil doux et tranquille, ce qu'il n'avoit fait depuis
longtemps. J'ordonnai une potion huileuse composée d'huile
d'amandes douces, d'Oxymel Scillitique et de Syrop de Guaiacum
dans laquelle je soutenus l'expectoration. Les bouillies de
veau furent continuées. Le Soir les crachats ~~se~~
se soutinrent et étoient toujours mêlés de sang. J'ordonnai
pour boisson ordinaire l'infusion de chiendent dans le lait
d'orge miellé et je nuis le malade à l'usage du lait de vache
(à défaut d'autre) cuit avec de l'eau d'orge pour toute nourriture.
Le 28. les crachats étoient toujours bruns, mais moins sanguinolens.



Les Symptômes diminuoient de plus en plus. Le 24.
il n'y avoit plus de sang dans les crachats, les urines
n'étoient plus ardentes, le Souffle étoit établi et la fièvre
tourmentoit le malade. Le 25. les urines commencèrent
à déposer un sédiment puriforme, ce qui continua
pendant Sept jours. Et le 26. l'expectation cessa tout
à coup sans cause apparente.

Je conseillai alors à Bonneau l'exercice du cheval
pour compléter la guérison. Il a joui depuis cet instant
de la santé la plus parfaite, il ne ressent plus ni
oppression, ni douleur de côté et vaque à ses travaux
ordinaires comme s'il n'eût jamais été malade.

On peut rapporter cette observation à celles
que M.^r Louis a discutées et insérées dans le cinquième
volume des mémoires de l'Académie (page 539. et suiv.)
et ne regarder la substance solide et vasculaire
que Bonneau a rendu par l'expectation que
comme un espèce de Kiste formé par une concrétion
lymphatique qui contenoit la grande
quantité de pus qu'il a rendue.

L'auteur me soit permis de témoigner de nouveau
ma reconnaissance à l'Académie au sujet de la

recompense distinctive qu'elle a bien voulu m'accorder
l'année dernière en couronnant mes travaux. Cette
faveur loin d'arrêter mon zèle ne fait qu'exalter de
plus en plus mon emulation pour m'efforcer à
meriter Ses Suffrages. Puisse-t'elle accueillir encore
avec indulgence ces observations que j'prends la
liberté de Soumettre à Son jugement.



1. *Leaves of the plant*
 2. *Leaves of the plant*
 3. *Leaves of the plant*
 4. *Leaves of the plant*
 5. *Leaves of the plant*
 6. *Leaves of the plant*
 7. *Leaves of the plant*
 8. *Leaves of the plant*
 9. *Leaves of the plant*
 10. *Leaves of the plant*